

Løsningsforslag til ukrudtsbekæmpelse forår 2012.

| | <u>Problem:</u> | <u>Dosering/middel:</u> | <u>Bemærkninger:</u> |
|--------------------------------------|--|--|---|
| Vårsæd: | Buresnerre, hanekro, fuglegræs, hvidmelet gåsefod, kamille, korsblomstret ukrudt | 0,25 l/ha Tomahawk 180 + 0,75 tab/ha Express ST | Temp. fra 10° og stigende |
| | Gul okseøje + god effekt mod andre arter | 0,7 tab/ha Ally ST + 0,35 l/ha Briotril | Sprøjt tidligt, gul okseøje max. 2 løvblade. |
| | Stedmoder, ærenpris pileurt, hanekro fuglegræs, hvidmelet gåsefod, kamille, korsblomstret ukrudt | 0,75 tab/ha Express ST + 0,25 l/ha Briotril eller 0,3 l Mustang Forte (HUSK forbehold) | |
| | + Græsukrudt Enårig rapgræs Vindaks mm | 0,025-0,035 l/ha Hussar + 0,05 DFF + 0,15 Briotril | |
| Vårsæd med udlæg af kløvergræs: | Frøukrudt | 0,75 l/ha Basagran M75 + 0,75 l/ha Stomp SC | Kløveren har sat 1 spadeblad Temp. fra 12° og stigende |
| | Alternativt 2 kørsler med: med 14 dages mellemrum | 0,5 l/ha Basagran M75 + 0,5 l/ha Stomp SC | 1 kørsel straks kløver har sat 1 Spadeblad, Er mere skånsomt mod kløveren |
| Frøgræs: | <u>Kamille</u> , burresnerre, Fuglegræs m.fl. | 0,1 l/ha Primus | Primo april. Fra 3° |
| | Kamille, burresnerre, Ærenpris m.fl. | 1,5 l/ha Ariane FG | Temp. o. 10-12° Ukrudt i god vækst |
| | Rodukrudt | Metaxon (MCPA 75%). Max 1,33 l/ha | På 2. års arealer Temp. fra 12° og stigende |
| Vedv. græs Fodergræs u. kløver | Skræppe, Mælkebøtte Tidsler mv | Metaxon max 1,33l/ha + Starane 0,5-0,8 l/ha Harmony SX 10- 15 g/ha | Temp fra 12° og stigende |
| Markært: | Frøukrudt | 0,75 l/ha Stomp SC + 0,75 l/ha Basagran M75 | 2 behandlinger med 8-10 dages mellemrum. |
| | Kvik, flyvehavre | 0,75-1,25 l/ha Focus Ultra eller 0,5 l/ha Agil | |

| | | | |
|-----------|---|---|--|
| Silomajs: | Frøukrudt | 1,0-1,5 l/ha. Callisto + 10 g/ha Harmony SX Fordelt af 2-3 gange | Der tilsættes 0,3 ltr. Tomahawk 180 i l. spr. V. sort natskygge beh. 3 gange |
| | Eller Bredbladet ukrudt, græsukrudt, kvik del af 2-3 gange ved pileurter | 40-100 gr./ha MaisTer Og 0,8 l/ha Callisto + 0,30 l/ha Tomahawk 180 | Kvik 2-3 blade |

Opfølgende sprøjtninger:

| | | |
|---|--|--------------|
| Vinterhvede, Frøukrudt -byg, -rug, triticale: 2 kimbladet ukrudt | 0,4-0,8 tab/ha Ally ST + 0,1 Spkl. | Temp. o. 5° |
| Burresnerre, pileurt + skræppe, padderokke, tidsel | 0,25-0,4 l/ha Tomahawk Eller 0,5 l Starane XL 0,5 l Mustang Forte (Husk forbehold) | Temp. o. 10° |

Ubehandlet/opfølgning Vintersæd:

| | | |
|--|--|---|
| Frøukrudt 2 kimbladet Ukrudt | 0,7 tab/ha Ally ST + 0,1 Spkl + | |
| <u>Enten</u> Kamille, burresnerre, Fuglegræs, Vindaks, rajgræs, etårig rapgræs | 0,05 – 0,1 l/ha Hussar OD | <u>IKKE I Vinterbyg</u> Temp fra 8° helst 10° svingende effekt på enårig rapgræs især ved lave temperaturer. |
| <u>Eller</u> | 0,45-0,9 l/ha Atlantis OD | <u>IKKE I Vinterbyg</u> Temp. fra 5° Rettidig kørsel lig mindste dosis Rug dog max 0,45 |
| <u>Eller</u> Kamille, Fuglegræs, Vindaks, Spildraps, Forglemmigej. Ager- Stedmor, flyvehavre | 100-130 g/ha Broadway + 0,05 DFF l/ha 0,5 l/ha PG26N | Kun i vinterhvede, rug og Triticale Temp. fra 5° |
| Alternativt: Kamille, Fuglegræs, Vindaks, Spildraps, Burresnerre, Rajgræs Agerstedmor, Gold hejre | 165-220 g/ha Broadway + 0,05 l/ha DFF + 0,5 l/ha PG26N | Kun i vinterhvede, rug triticale Temp. fra 5° |

| | | | |
|-------------|---|--|---|
| | Kvik, Flyvehavre | | |
| | Vindaks, Alm. rapgræs Kvik, Kamille, Buresnerre, Fuglegræs | 12,5 g/ha Monitor | KUN i vinterhvede Temp. Fra 5° |
| | Gold- og Blød Hejre | 110 g Broadway 12,5 g Monitor | KUN i vinterhvede 14 dage senere |
| Vinterraps: | Græsukrudt | 0,8 l/ha Kerb 400 | Temp under 10° helst når rapsen er faldet sammen så jorden er bar |
| | Moderate angreb Kamille | 0,75 l/ha Matrigon + 0,5 Renol | Temp. 12° og stigende |
| | Store problemer kamiller tidsler snerlepileurt Buresnerre kornblomst Hvidmelet gåsefod | 0,20 l/ha Galera + 0,2 l/ha PG26N | OBS OBS!! Pas På Temp fra 8° og stigende SKAL KØRES TIDLIGT dvs. skal køres i god tid inden raps blomsteranlæg er fremme og vi er ved stadie 50 herefter høj risiko for skade |
| | Spildkorn flyvehavre og visse græsser | 0,50 l/ha. Agil + 0,1 l/ha Spkl. | Bedst v/10-12° og passende jordfugtighed |
| | Eller | 1,25 l/ha Focus Ultra + 0,5 l/ha Dash | Større forekomster af kvik kræver 20% ekstra dosis |

Flyvehavrebekæmpelse:

Anvendelsesdata for Primera Super og Topik.

| | | Primera Super | Broadway | Topik |
|------------------------------|-----------|---|---|---|
| Dosering | Vårsæd | 0,6 l/ha + 0,1 l/ha spkl | | |
| | Vintersæd | 0,8 l/ha + 0,1 l/ha spkl. | 100 g/ha Broadway + 0,5 l/ha PG26N Mod overvintret flyvehavre. Bruges kun hvis der ikke er ukrudts-behandlet i efteråret. Der ventes med at behandle til forårsfremspiret flyvehavre er kommet op. 70 - 90 % effekt. | 0,2 l/ha KUN i vinterhvede |
| Godkendelse | | Vår- og Vinterhvede, vår- og vinterbyg, rug, triticale og på brakmarker | Kun i Vinterhvede rug og triticale | Vinterhvede |
| Udlæg i vintersæden | | Kun rødsvingel og engsvingel | Ikke muligt | Ikke muligt |
| Frøgræs | | Ingen anvendelse | Ingen anvendelse | Ingen anvendelse |
| Behandlingsfrist | | 10 uger (helsæd: 6 uger) | Senest st. 39 | 3 måneder |
| Sidste udkald for Anvendelse | | Vinterhvede: st. 39 Rug, triticale: st. 30 Vinterbyg: st. 30 Vårhvede: st. 30 Vårbyg: st. 30 | Senest st. 39 | Vinterhvedens st. 29 |
| Øvrige effekter | | Kan bekæmpe: agerrævehale og vindaks | Kan bekæmpe: Vindaks, Agerrævehale og betydelig effekt på Rajgræs Hæmning af Kvik og Hejrearter | Kan bekæmpe: vindaks og agerrævehale, betydelig hæmning af rajgræsser |
| Afstand til anden Sprøjtning | | Til behandling med midlerne Ally, Logran 20 WG, Primus, Synergy, Banvel 4S, Basagran og hormonmidler skal der holdes en afstand på mindst 10 dage før og efter en sprøjtning med Primera Super. | | |

Løsningsforslag til svampe- og insektbekæmpelse 2012

| | | |
|--|--|---|
| Vinterhvede: Meldug | 0,125 l/ha. Flexity/ | <u>Ultimo april</u> – st. 25 - 29 |
| Eller | 0,15 l/ha Tern | Ved meldug følsomme sorter |
| Ved bladplet | + 0,15 Bumper | Ved problemer med bladplet Ved reduceret jordbearbejdning |
| Septoria rust mv | 0,50-0,80 l/ha Bell + 0,15 Comet | <u>Ultimo maj til medio juni</u> Ved 2 delt aksbeskyttelse |
| Ved bladplet | + 0,15 Bumper | Ved problemer m bladplet Ved reduceret jordbearbejdning |
| Eller | 0,50 l/ha Bell + 0,15 l/ha Comet | Ved 1 aksbeskyttelse |
| Bladlus | 0,05 l/ha Mavrik 2 F | Medtages ved aksbeskyttelsen |
| <hr/> | | |
| Vinterbyg: Meldug, Skoldplet, Bygbladplet | 0,125 l/ha Comet + 0,125 l/ha Folicur | <u>Ultimo april</u> – st. 29 - 30 |
| | 0,125 l/ha Comet + 0,125 l/ha Folicur | <u>Medio maj</u> - st. 43 – 49 Ved begyndende skridning |
| Bladlus | 0,05 l/ha Mavrik 2 F | |
| <hr/> | | |
| Vinterrug: Meldug, Skoldplet brunnrust | 0,15-0,3 l/ha Folicur | Ved begyndende skridning. |
| Trips | 0,2 l/ha Cyperb 100 | Køres lige inden skridning ved trips i bladskeder |
| <hr/> | | |
| Vårbyg: Meldug, Skoldplet, Bygbladplet | 0,125 l/ha Comet + 0,125 l/ha Folicur | <u>Primo maj</u> sammen med første ukrudtsprøjtning |
| | + 0,125 l/ha Comet + 0,125 l/ha Folicur | |
| Bladlus kornbladbillens larve | 0,05 l/ha Mavrik 0,10 l/ha Cyperb 100 | |

| | | | |
|-----------------------|---------------|--|---------------------------|
| Vinter- og Vårraps | Skulpesvamp | 0,35 l/ha Folicur + 0,35 l/ha Amistar | Ved begyndende blomstring |
| | Skadedyr | | |
| | Glimmerbøsser | 0,20 l/ha Biscaya | |
| | Eller | 0,20 l/ha Mavrik 2F | |
| | Snudebiller | 0,2 l/ha Cyperb 100 | |
| | Skulpegalmug | | |
